

Abstrakt

Bakalářská práce „Dekubitus jako nežádoucí událost“ se zabývá porovnáním modifikované škály Nortonové a škály Bradenové. Dále se práce zabývá četností výskytu dekubitů v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. **Cílem práce** bylo porovnat přesnost obou škál. Dalším cílem práce bylo provést monitoring zavedených preventivních opatření. Součástí práce bylo zjistit a popsat četnost výskytu dekubitů ve vybraném zdravotnickém zařízení. V **teoretické části** práce byly vysvětleny základní definice a zásadní pojmy týkající se dekubitů, nežádoucí událostí a resortních bezpečnostních cílů. **Empirická část** obsahuje výsledky vlastního výzkumného šetření a jeho srovnání s výsledky studií zaměřujících se na podobná témata. **Metoda:** byla zvolena kombinovaná metoda výzkumu. **Výsledky:** U 48,48 % respondentů bylo riziko vzniku dekubitu dle obou škál vyhodnoceno souhlasně. U 51,52 % respondentů vyhodnocení dle jedné škály neodpovídalo vyhodnocení dle škály druhé. Škála Bradenové měla senzitivitu 100 % a specifickou 59%. Škála Nortonové měla senzitivitu také 100 %, ale významně nižší specifickou 3 %. Z používaných preventivních opatření byla nejčastěji zavedena péče o kůži, hodnocení bolesti a úprava lůžka. Následována jsou opatřeními ve výživě, hydrataci a polohováním. Nejméně bylo zavedeno používání antidekubitních pomůcek a rehabilitace. V rámci zjišťování četnosti výskytu dekubitů bylo zjištěno, že počty pacientů s rizikem vzniku dekubitu jsou během roku rozdílné. Četnost pacientů s dekubitem a četnost nově vzniklých dekubitů byla v lednovém a prosincovém šetření vyšší. Četnost výskytu donesených dekubitů je vyrovnaná. **Závěr:** Škála Bradenové dosáhla v šetření stejné míry senzitivity, ale výrazně lepší míry specifické. Nejčastěji jsou používána preventivní opatření, která jsou jednoduchá, účinná a dostupná. Z šetření vyplynulo, že četnost pacientů s dekubitem a četnost nově vzniklých dekubitů byla vyšší v prosinci a lednu.