

## **Abstrakt**

Předkládaná diplomová práce je pilotní validizační studií speciální škály Schizophrenia Proneness (SzP; Bolinsky et al., 2001). Škála byla dodatečně vytvořena z položek MMPI-2 za účelem predikovat zvýšenou tendenci k budoucímu rozvoji schizofrenie a onemocnění schizofrenního okruhu. Přes slibné dosavadní výsledky je nutné dále ověřovat vlastnosti této škály, mimo jiné na vzorku pacientů, kteří již jsou v akutní fázi onemocnění (Nichols & Crowhurst, 2006). Cílem této práce je popis škály a její pilotní validizace na vzorku právě těchto pacientů.

Literárně přehledová část je rozdělena do tří kapitol popisujících: schizofrenii a možnosti predikce schizofrenie a psychózy; psychodiagnostickou metodu MMPI-2 a specifika jejího použití na lůžkovém psychiatrickém oddělení; škálu SzP, její vývoj a vlastnosti. Cílem výzkumu bylo pilotně ověřit validitu škály SzP v českém prostředí porovnáním výsledků pacientů s potížemi psychotické povahy oproti pacientům s nepychotickou povahou obtíží. Výzkumný vzorek tvořilo 312 pacientů. V rámci Studentova *t*-testu pro nezávislé výběry nebyl nalezen statisticky signifikantní rozdíl mezi zmiňovanými skupinami pacientů. Na základě toho nebylo přistoupeno k explorování cut-off skóru pro nejlepší možné rozlišení psychotických rysů, které bylo návazným cílem práce. Výsledky jsou v kontrastu oproti předchozímu výzkumu, nepodařilo se shromáždit důkazy o validitě škály na tomto vzorku. Výsledky je třeba ověřit v dalším výzkumu.